Αοι

Vai al contenuto multimediale

Carmen Carano

**Logaritmi e potenze
nell'insieme dei numeri complessi**

Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1991-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: novembre 2018

7 Capitolo I

Dalla formula di Eulero al logaritmo in C

1.1. Calcolo in C del logaritmo con base reale (positiva e diversa da 1) di un numero reale negativo, 10 – 1.2. Calcolo in C del logaritmo con base reale (positiva e diversa da 1) di un numero immaginario, 10 – 1.3. Calcolo in C del logaritmo con base reale (positiva e diversa da 1) di un numero complesso (diverso da 0), 11 – 1.4. Calcolo in C del logaritmo con base complessa w (diversa da 0 e da 1) di un numero complesso u (diverso da 0), 12

13 Capitolo II

Calcolo delle potenze in C

2.1. Calcolo di $u=e^z$ con $z=f+ig$, 13 – 2.2 Calcolo di $(c+id)^{f+ig}$, 14 – 2.3 Formula di De Moivre come caso particolare della formula (2), 17 – 2.4. Calcolo della radice n -esima di un numero complesso, 17 – 2.5 La radice n -esima in R come caso particolare della radice n -esima in C , 18 – 2.5.1. Radici quadrate in R , 18 – 2.5.2. Radici cubiche in R , 20

Logaritmi e Potenze nell'insieme dei Numeri Complessi

Sulla questione della polidromia

*Carmen Carano*¹

Sunto

In questo articolo, partendo dalla formula di Eulero, si arriva alla formula per il calcolo del logaritmo e da questa a quella per il calcolo della potenza in C , affrontando contestualmente la questione della polidromia e verificando come tali operazioni, con opportune restrizioni, siano del tutto coerenti con la formula di De Moivre e con le operazioni di logaritmo e di potenza (e quindi anche di radice n -esima) in R , risultando pertanto una naturale estensione delle stesse da R a C .

1. Dalla formula di Eulero al logaritmo in C

Come è noto, a partire dalla formula di Eulero:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

¹ ITST "G. Marconi" – Campobasso. e-mail: c.carano@tiscali.it.

si ottiene la definizione di logaritmo (e da questa, come vedremo nel paragrafo 2., quella di potenza) nell'insieme dei numeri complessi.

Per arrivare alla definizione di logaritmo in $\mathbb{C}$, dovremo passare dalla formula di Eulero $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$, alla $ix = \ln(\cos x + i \operatorname{sen} x)$.

Di fatto ciò significa passare dalla funzione $u(x) = e^{ix}$ (complessa di variabile reale), alla sua inversa $x(u) = (1/i) \cdot \ln u$ (reale di variabile complessa: $\forall x \in \mathbb{R}$, quindi, $(\ln(\cos x + i \operatorname{sen} x))/i \in \mathbb{R}$).

Affinché una funzione sia invertibile, deve essere biunivoca, ma $u(x)$ ha come dominio tutto $\mathbb{R}$ (il suo codominio è invece l'insieme dei numeri complessi rappresentati, nel piano di Gauss, dagli infiniti punti della circonferenza di centro O e raggio unitario) ed è periodica² (di periodo 2π), pertanto sicuramente non biunivoca. Per renderla invertibile bisognerà restringere il suo dominio a un insieme all'interno del quale abbia ancora lo stesso codominio e risulti biunivoca. Si vede facilmente che basterà considerare come dominio della $u(x)$ un qualunque intervallo di ampiezza pari al suo periodo³.

² Due funzioni, una l'inversa dell'altra, hanno dominio e codominio che si invertono, pertanto se una delle due è periodica e quindi assume lo stesso valore in corrispondenza di infiniti valori della variabile indipendente, l'inversa (se non operiamo un opportuno restringimento del dominio) assume per ogni valore assegnato dell'argomento, infiniti valori.

³ La $u(x)$, definita da D al suo codominio, è ovviamente suriettiva. Affinché sia anche iniettiva dobbiamo restringere D in modo che a valori diversi della variabile indipendente x corrispondano valori diversi della $u(x)$ e quindi in modo che

$$u(x_1) = u(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

$$\cos x_1 + i \operatorname{sen} x_1 = \cos x_2 + i \operatorname{sen} x_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x_1 = \cos x_2 \\ \operatorname{sen} x_1 = \operatorname{sen} x_2 \end{cases} \quad \text{cioè:}$$

$$((x_1 = x_2 + 2k\pi) \vee (x_1 = -x_2 + 2k\pi)) \wedge (x_1 = x_2 + 2h\pi) \vee (x_1 = \pi - x_2 + 2h\pi) \quad \forall k, h \in \mathbb{Z}$$

$$\quad \forall k, h \in \mathbb{Z} \text{ e si vede facilmente che ciò si verifica } \Leftrightarrow x_1 = x_2 + 2m\pi \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Consideriamo d'ora in poi la restrizione del dominio della $u(x)$ all'intervallo $D_R = [0; 2\pi[$ ⁴; i punti del piano di Gauss che rappresentano il codominio della funzione, descriveranno una sola volta la circonferenza di centro O e raggio unitario e si potrà quindi considerare la funzione inversa della $u(x)$, cioè la funzione $x(u) = (1/i) \cdot \ln u$.

In quanto segue, applicheremo il principio di permanenza delle proprietà formali di Hankel e quindi, per arrivare alle definizioni di logaritmo e di potenza in C, supporremo che permangano le proprietà di tali operazioni, valide in R, anche nel campo complesso (le proprietà delle potenze e, da queste, le proprietà e la formula del cambiamento di base dei logaritmi).

Dalla formula di Eulero con dominio D_R , si ottiene:

$$ix = \ln(\cos x + isenx)$$

⁴ Scegliendo $D_R = [0; 2\pi[$, il codominio della $u(x)$, e quindi il dominio della funzione inversa $x(u)$, sarà costituito dai numeri complessi di modulo 1 e argomento anch'esso variabile in $[0; 2\pi[$, mentre il codominio della funzione inversa sarà ovviamente $C_I = D_R = [0; 2\pi[$.

Scegliendo $D_R = [p; q[$, sempre di ampiezza 2π , il codominio della $u(x)$, e quindi il dominio della $x(u)$, sarà costituito dai numeri complessi di modulo 1 e argomento variabile in $[p; q[$ (rappresentati nel piano di Gauss dagli infiniti punti della circonferenza goniometrica, presi una sola volta) mentre il codominio della funzione inversa sarà ovviamente $C_I = D_R = [p; q[$; al variare del restringimento del dominio, operato affinché la funzione risulti invertibile, quindi, varierà anche il codominio della funzione inversa.

Questo è equivalente a ciò che succederebbe se, per esempio, per invertire la funzione seno, si restringesse il suo dominio non come convenzionalmente si fa all'intervallo $[-\pi/2; \pi/2]$, ma ad un altro intervallo in cui tale funzione sia biunivoca, per esempio all'intervallo $[\pi/2; (3/2)\pi]$; ovviamente in tal caso il codominio dell'arcoseno sarebbe $[\pi/2; (3/2)\pi]$.

Ritornando al nostro caso, scegliendo di restringere il dominio in modi diversi, il codominio della funzione $u(x)$, pur rimanendo, per la periodicità della funzione, sempre lo stesso insieme di numeri complessi, sarà costituito da numeri complessi con lo stesso modulo ma con argomenti diversi: tali argomenti saranno variabili proprio nell'intervallo $D_R = [p; q[$ di ampiezza 2π in cui abbiamo ristretto il dominio.

da cui, per $x = \pi$, si ha:

$$\ln(-1) = i\pi \quad (1)$$

L'uguaglianza (1) permette, come è noto, di estendere l'operatore logaritmo definito in $\mathbb{R}$ (con argomento positivo e base positiva e diversa da 1), al logaritmo definito in $\mathbb{C}$ (con argomento diverso da 0 e base diversa da 0 e da 1).

1.1. Calcolo in $\mathbb{C}$ del logaritmo con base reale (positiva e diversa da 1) di un numero reale negativo

Calcoliamo, per esempio, $\ln(-3)$:

$$\ln(-3) = \ln(3) + \ln(-1) = \ln(3) + i\pi$$

In generale, per un generico $a < 0$, risulterà:

$$\ln(a) = \ln|a| + \ln(-1) = \ln|a| + i\pi$$

e, per una base c (con $c \in \mathbb{R}^+$, $c \neq 1$):

$$\log_c a = \frac{1}{\ln c} (\ln|a| + \ln(-1)) = \frac{1}{\ln c} (\ln|a| + i\pi)$$

1.2. Calcolo in $\mathbb{C}$ del logaritmo con base reale (positiva e diversa da 1) di un numero immaginario

Calcoliamo, per esempio, $\ln(3i)$ e $\ln(-3i)$:

$$\ln(3i) = \ln 3 + \ln i = \ln 3 + \ln(\sqrt{-1}) = \ln 3 + i\frac{\pi}{2}$$

e:

$$\ln(-3i) = \ln(-1) + \ln 3 + \ln i = i\pi + \ln 3 + i\frac{\pi}{2} = \ln 3 + i\frac{3}{2}\pi$$

In generale:

- se $b > 0$

$$\ln(bi) = \ln b + i\frac{\pi}{2}$$

- se $b < 0$

$$\ln(bi) = \ln|b| + i \frac{3}{2} \pi$$

e per una base c (con $c \in R^+, c \neq 1$):

- se $b > 0$

$$\log_c(bi) = \frac{1}{\ln c} \left(\ln b + i \frac{\pi}{2} \right)$$

- se $b < 0$

$$\log_c(bi) = \frac{1}{\ln c} \left(\ln|b| + i \frac{3}{2} \pi \right)$$

1.3. Calcolo in C del logaritmo con base reale (positiva e diversa da 1) di un numero complesso (diverso da 0)

Consideriamo il generico numero complesso non nullo $u = a + ib$ ($a, b \in R$), di modulo ρ e argomento α e quindi avente forma trigonometrica $u = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ⁵.

Per la formula di Eulero è:

$$u = \rho(\cos \alpha + i \sin \alpha) = \rho e^{i\alpha}$$

pertanto sarà:

$$\ln u = \ln(\rho(\cos \alpha + i \sin \alpha)) = \ln \rho + \ln e^{i\alpha}$$

e, per quanto detto in precedenza, per poter calcolare $\ln e^{i\alpha}$, dovremo far variare

⁵ Con $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\alpha = \arctg(b/a)$ se $a > 0$, $\alpha = \arctg(b/a) + \pi$ se $a < 0$.

α in un intervallo di ampiezza 2π , per esempio in $[0;2\pi[$ ⁶.

Avremo quindi:

$$\ln u = \ln(\rho(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)) = \ln \rho + i\alpha$$

in cui $\alpha \in [0;2\pi[$ ⁷.

Per una generica base c (con $c \in \mathbb{R}^+$, $c \neq 1$):

$$\log_c(\rho(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)) = \frac{1}{\ln c} (\ln \rho + \ln(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)) = \frac{1}{\ln c} (\ln \rho + i\alpha)$$

sempre con $\alpha \in [0;2\pi[$.

1.4. Calcolo del logaritmo con base complessa w (diversa da 0 e da 1) di un numero complesso u (diverso da 0)

Considerati $w = c + id \in \mathbb{C} - \{0,1\}$ e $u = a + ib \in \mathbb{C} - \{0\}$, di coordinate polari rispettivamente (ρ_1, α_1) e (ρ_2, α_2) , sar\`a:

$$\log_{c+di}(a+ib) = \frac{\ln(a+ib)}{\ln(c+id)} = \frac{\ln(\rho_1(\cos \alpha_1 + i \operatorname{sen} \alpha_1))}{\ln(\rho_2(\cos \alpha_2 + i \operatorname{sen} \alpha_2))} = \frac{\ln \rho_1 + \ln e^{i\alpha_1}}{\ln \rho_2 + \ln e^{i\alpha_2}}$$

Come nel sottoparagrafo **1.3.**, per poter calcolare $\ln e^{i\alpha_1}$ e $\ln e^{i\alpha_2}$, bisogna far variare α_1 e α_2 in intervalli di ampiezza 2π (non necessariamente uguali), per esempio in $[0;2\pi[$.

⁶ Se non operassimo tale restrizione sull'intervallo in cui far variare α , sarebbe ovviamente come se calcolassimo, per esempio, $\arcsin(\operatorname{sen} \alpha)$ senza aver ristretto opportunamente il dominio della funzione seno, e quindi il codominio della funzione arcoseno, a un intervallo in cui tale funzione \`e invertibile, ottenendo pertanto  $\arcsin(\operatorname{sen} \alpha) = \alpha + 2k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$ , cio\`e si avrebbero infiniti valori, come per l'inversa di una qualunque funzione periodica.

⁷ Quindi, come \`e noto, il logaritmo naturale di un numero complesso di modulo  $\rho$  e argomento  $\alpha$  \`e un numero complesso avente parte reale $\ln \rho$ e coefficiente dell'unit\`a immaginaria α .

Avremo quindi la seguente formula generale per il calcolo del logaritmo in $\mathbb{C}$:

$$\log_{c+id}(a+ib) = \frac{\ln \rho_1 + i\alpha_1}{\ln \rho_2 + i\alpha_2} \quad (1)$$

in cui $\alpha_1, \alpha_2 \in [0; 2\pi[$.

In generale, per ogni scelta degli intervalli $[p; q[$, con $q - p = 2\pi$, in cui faremo variare α_1 e α_2 , il logaritmo è un unico numero complesso; in corrispondenza degli infiniti intervalli $[p; q[$ che si possono scegliere, si avranno infiniti valori del logaritmo diversi tra loro (per due qualunque di essi, le differenze tra i due argomenti di $a+ib$ e tra i due argomenti di $c+id$ saranno ovviamente multipli interi di 2π).

Per ognuna delle determinazioni del logaritmo (in corrispondenza della scelta degli intervalli in cui imporrò che varino α_1 e α_2) sarà ovviamente:

$$\text{mod}(\log_w u) = \text{mod}(\ln u) / \text{mod}(\ln w) \quad \text{e} \quad \arg(\log_w u) = \arg(\ln u) - \arg(\ln w).$$

Affinché però la formula (1) sia coerente con la definizione di logaritmo in $\mathbb{R}$, e pertanto il logaritmo in $\mathbb{C}$ sia una generalizzazione del logaritmo in $\mathbb{R}$, sarà necessario che $\alpha_1, \alpha_2 \in [0; 2\pi[$ (o che comunque appartengano a un intervallo di ampiezza 2π che contenga lo 0)⁸.

2. Calcolo delle potenze in $\mathbb{C}$

2.1. Calcolo di $u = e^z$ con $z = f + ig$

Per la formula di Eulero, sarà:

$$u = e^z = e^{f+ig} = e^f \cdot e^{ig} = e^f (\cos g + iseng).$$

In forma trigonometrica, se ρ_3 e α_3 sono rispettivamente il modulo e l'argomento di z e se indichiamo con ρ_1 e α_1 rispettivamente il modulo e l'argomento del numero u cercato, sarà:

⁸ In tal caso infatti, se $a+ib \in \mathbb{R}^+$ e $c+id \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$, sarà ovviamente $\rho_1 = a$, $\rho_2 = c \neq 1$ e $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

$$u = e^z = e^{\rho_3(\cos \alpha_3 + i \operatorname{sen} \alpha_3)} = e^{\rho_3 \cos \alpha_3} (\cos(\rho_3 \operatorname{sen} \alpha_3) + i \operatorname{sen}(\rho_3 \operatorname{sen} \alpha_3))$$

e quindi:

$$\rho_1 = e^{\rho_3 \cos \alpha_3} \quad \text{e} \quad \alpha_1 = \rho_3 \operatorname{sen} \alpha_3.$$

2.2. Calcolo di $(c + id)^{f+ig}$

Nel sottoparagrafo **1.4.** abbiamo visto che, $\forall u \in C - \{0\}$ e $\forall w \in C - \{0,1\}$, restringendo gli insiemi in cui far variare gli argomenti di u e w a intervalli di ampiezza 2π , si ottiene:

$$\log_w u = \frac{\ln \rho_1 + i \alpha_1}{\ln \rho_2 + i \alpha_2}$$

(con ρ_1 e ρ_2 e con α_1 e α_2 rispettivamente moduli e argomenti di u e di w); per rendere la definizione di logaritmo in C coerente con quella di logaritmo in R , abbiamo scelto $\alpha_1, \alpha_2 \in [0; 2\pi[$.

Tale numero complesso può essere riscritto nella forma:

$$\log_w u = \frac{(\ln \rho_1 \ln \rho_2 + \alpha_1 \alpha_2)}{(\ln \rho_2)^2 + (\alpha_2)^2} + i \frac{(\alpha_1 \ln \rho_2 - \alpha_2 \ln \rho_1)}{(\ln \rho_2)^2 + (\alpha_2)^2}$$

e quindi è, al variare di ρ_1 e ρ_2 in R^+ , un qualunque numero appartenente all'insieme C (la parte reale e il coefficiente dell'unità immaginaria variano in tutto R).

Pertanto, consideriamo un qualunque numero complesso $z=f+ig$ e una generica base complessa non nulla $w=c+id$ e diversa da 1.

Cerchiamo un numero complesso non nullo $u=a+ib$ tale che:

$$f + ig = \log_{c+id}(a + ib)$$

In forma trigonometrica, siano $a + ib = \rho_1(\cos \alpha_1 + i \operatorname{sen} \alpha_1)$,
 $c + id = \rho_2(\cos \alpha_2 + i \operatorname{sen} \alpha_2)$, $f + ig = \rho_3(\cos \alpha_3 + i \operatorname{sen} \alpha_3)$.

Dovrà essere:

$$\rho_3(\cos \alpha_3 + i \operatorname{sen} \alpha_3) = \frac{\ln \rho_1 + i \alpha_1}{\ln \rho_2 + i \alpha_2}$$

da cui:

$$\ln \rho_1 + i\alpha_1 = (\rho_3(\cos \alpha_3 + i\operatorname{sen}\alpha_3)) \cdot (\ln \rho_2 + i\alpha_2)$$

cioè:

$$\ln \rho_1 + i\alpha_1 = \rho_3 \cos \alpha_3 \ln \rho_2 + i\rho_3 \alpha_2 \cos \alpha_3 + i\rho_3 \operatorname{sen}\alpha_3 \ln \rho_2 - \rho_3 \alpha_2 \operatorname{sen}\alpha_3$$

Dovrà quindi essere

$$\ln \rho_1 = \rho_3(\ln \rho_2 \cos \alpha_3 - \alpha_2 \operatorname{sen}\alpha_3)$$

da cui (se facciamo variare α_3 in un intervallo di ampiezza 2π in modo da rendere invertibile la funzione $\ln \rho_1$):

$$\rho_1 = e^{\rho_3(\ln \rho_2 \cos \alpha_3 - \alpha_2 \operatorname{sen}\alpha_3)} = \frac{(e^{\ln \rho_2})^{\rho_3 \cos \alpha_3}}{e^{\rho_3 \alpha_2 \operatorname{sen}\alpha_3}} = \frac{\rho_2^{\rho_3 \cos \alpha_3}}{e^{\alpha_2 \rho_3 \operatorname{sen}\alpha_3}}$$

e:

$$\alpha_1 = \rho_3(\alpha_2 \cos \alpha_3 + \operatorname{sen}\alpha_3 \ln \rho_2).$$

Avremo quindi la formula generale per il calcolo della potenza in C:

$$(c + id)^{f+ig} = (\rho_2(\cos \alpha_2 + i\operatorname{sen}\alpha_2))^{\rho_3(\cos \alpha_3 + i\operatorname{sen}\alpha_3)} =$$

$$\frac{\rho_2^{\rho_3 \cos \alpha_3}}{e^{\rho_3 \alpha_2 \operatorname{sen}\alpha_3}} (\cos(\rho_3(\alpha_2 \cos \alpha_3 + \operatorname{sen}\alpha_3 \ln \rho_2)) + i\operatorname{sen}(\rho_3(\alpha_2 \cos \alpha_3 + \operatorname{sen}\alpha_3 \ln \rho_2)))$$

che, equivalentemente, se ρ_2 e α_2 sono rispettivamente il modulo e l'argomento di $c + id$, può essere riscritta nella forma più sintetica:

$$(c + id)^{f+ig} = \frac{\rho_2^f}{e^{g\alpha_2}} (\cos(f\alpha_2 + g \ln \rho_2) + i\operatorname{sen}(f\alpha_2 + g \ln \rho_2)) \quad (2)$$

in cui $f = \rho_3 \cos \alpha_3$ e $g = \rho_3 \operatorname{sen}\alpha_3$.

Se f è un numero intero, il valore della potenza è unico per $\alpha_2 \in [2k\pi; 2(k+1)\pi[$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Se f è un numero irrazionale, per ogni scelta degli intervalli di ampiezza

2π in cui possiamo far variare α_2 , si ottiene un unico numero complesso che rappresenta la potenza w^z e al variare degli infiniti intervalli che si possono scegliere, come per il logaritmo, si avranno infiniti valori diversi di tale potenza.

Se $f = m/n \in Q$, al variare di α_2 negli intervalli $[2k\pi; 2(k+1)\pi[$ con k che assume n valori interi consecutivi, si ottengono n valori diversi della potenza; per tutti gli altri valori interi di k , precedenti e successivi, i valori corrispondenti della potenza si ripetono ciclicamente di n in n^9 .

La formula (2), nel caso in cui w e z siano numeri reali, risulta coerente con la definizione di potenza in R^{10} .

⁹Quindi, $\forall (f + ig) \in C$ e $\forall (c + id) \in C - \{0; 1\}$,

- se f è un numero intero esisterà un unico $a + ib \in C - \{0\}$ tale che

$$f + ig = \log_{c+id}(a + ib);$$

- se $f = m/n \in Q$ esisteranno n numeri diversi $a + ib \in C - \{0\}$ tali che

$$f + ig = \log_{c+id}(a + ib);$$

- se $f \notin Q$ esisteranno infiniti numeri diversi $a + ib \in C - \{0\}$ tali che

$$f + ig = \log_{c+id}(a + ib).$$

¹⁰In tal caso infatti, se $w = c + id \in R - \{0, 1\}$ e $z = f + ig \in R$, sarà ovviamente (se facciamo variare α_2 in $[0; 2\pi[$):

$\rho_2 = c$ e $\alpha_2 = 0$ se $c > 0$, $\rho_2 = -c$ e $\alpha_2 = \pi$ se $c < 0$. Applicando la (2):

- se $c > 0$, $\forall f \in R$, sarà:

$$w^z = c^f (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = c^f (\cos 0) = c^f \in R.$$

- se $c < 0$

se f è un numero intero (sia per f pari, che per f dispari), sarà:

$$w^z = (-c)^f (\cos(f\pi) + i \operatorname{sen}(f\pi)) = (-c)^f (\cos(f\pi)) = c^f \in R;$$

se $f = m/n \in Q$, sarà (sia per m pari che per m dispari):

$$w^z = \left((-c)^m (\cos(m\pi) + i \operatorname{sen}(m\pi)) \right)^{1/n} = \left((-c)^m (\cos(m\pi)) \right)^{1/n} = \left(c^m \right)^{1/n} = c^f$$

che se n è dispari è un numero reale per ogni m , se n è pari è un numero reale solo se m è pari (quindi se m/n è una frazione ridotta ai minimi termini $\notin R$);

se $f \notin Q$, sarà:

$$w^z = (-c)^f (\cos(f\pi) + i \operatorname{sen}(f\pi)) \notin R.$$

(In R infatti, se $f \notin Q$, non si definisce c^f nel caso in cui $c < 0$).

La potenza w^z assume, se $z \in Z$, lo stesso valore con $\alpha_2 \in [2k\pi; 2(k+1)\pi[$, $\forall k \in Z$.

Ovviamente dalla (2) si ha anche $1^z = 1 \quad \forall z \in R$ e $0^z = 0 \quad \forall z \in R^+$.

2.3. Formula di De Moivre come caso particolare della formula (2)

La formula (2), se $z \in R$ (e quindi $g = 0$), sarà:

$$u = (c + id)^f = \rho_2^f (\cos(f\alpha_2) + isen(f\alpha_2))$$

che, per $f \in N$ (o se, più in generale, f è un qualunque numero intero), è la formula di De Moivre.

È evidente che, per valori assegnati di f e di ρ_2 , u assume lo stesso valore tutte le volte che si attribuiscono a α_2 valori che differiscono per multipli intero di $(2\pi)/f$, quindi si può pensare come una funzione della variabile α_2 , periodica di periodo $(2\pi)/f$.

2.4. Calcolo della radice n -esima di un numero complesso

Come abbiamo visto nel sottoparagrafo **2.2.**, se $f = m/n \in Q$, i valori delle potenze che si ottengono per $\alpha_2 \in [2k\pi; 2(k+1)\pi[$ al variare di k in Z , assumono n valori diversi tra loro che si ripetono ciclicamente di n in n .

Calcoliamo quindi gli n valori diversi della potenza per $f = 1/n$.

Se $y = \rho(\cos \alpha + isen \alpha)$, come è noto, le radici n -esime di y saranno i numeri complessi:

$$\rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + isen \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \text{ con } k = 0, 1, 2, \dots, (n-1).$$

Ricalcoliamo tali radici partendo dalla (2). Si ha:

$$y^{\frac{1}{n}} = (\rho(\cos \alpha + isen \alpha))^{\frac{1}{n}} = \rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\alpha}{n} + isen \frac{\alpha}{n} \right) \quad (3)$$

che assume un unico valore per ognuno degli infiniti intervalli $[2k\pi; 2(k+1)\pi[$, con $k \in Z$, in cui può variare l'argomento della base.

Come visto nel sottoparagrafo precedente, gli n valori della radice n -esima di y che si ottengono per $k=0, 1, 2, \dots, (n-1)$, con argomenti appartenenti rispettivamente agli intervalli: $[0; (2\pi)/n[$, $[(2\pi)/n; (4\pi)/n[$, $\dots, [(2(n-1)\pi)/n; 2\pi[$, sono diversi tra loro.

Al variare di k comunque in Z , i valori delle radici trovati per $k=0, 1, 2, \dots, (n-1)$, come detto precedentemente, si ripetono ciclicamente di n in n .

Se $\alpha \in [0; 2\pi[$, sarà:

$$(\alpha + 2\pi) \in [2\pi; 4\pi[, (\alpha + 4\pi) \in [4\pi; 6\pi[, \dots (\alpha + 2(n-1)\pi) \in [2(n-1)\pi; 2n\pi[$$

e le radici corrispondenti a tali n valori degli argomenti di y saranno quindi, le seguenti:

$$y^{\frac{1}{n}}_1 = (\rho(\cos \alpha + isen \alpha))^{\frac{1}{n}} = \rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\alpha}{n} + isen \frac{\alpha}{n} \right)$$

cioè la radice n -esima di y con argomento appartenente all'intervallo $[0; (2\pi)/n[$;

$$y^{\frac{1}{n}}_2 = \rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\alpha + 2\pi}{n} + isen \frac{\alpha + 2\pi}{n} \right)$$

cioè la radice n -esima di y con argomento appartenente all'intervallo $[(2\pi)/n; (4\pi)/n[$;

$$y^{\frac{1}{n}}_3 = \rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\alpha + 4\pi}{n} + isen \frac{\alpha + 4\pi}{n} \right)$$

cioè la radice n -esima di y con argomento appartenente all'intervallo $[(4\pi)/n; (6\pi)/n[$ e così via...;

$$y^{\frac{1}{n}}_n = \rho^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\alpha + 2(n-1)\pi}{n} + isen \frac{\alpha + 2(n-1)\pi}{n} \right)$$

cioè la radice n -esima di y con argomento appartenente all'intervallo $[(2(n-1)\pi)/n; 2\pi[$.

2.5. La radice n -esima in R come caso particolare della radice n -esima in C

2.5.1. Radici quadrate

I valori della radice quadrata di un generico numero complesso $y = \rho(\cos \alpha + isen \alpha)$ si otterranno dalla formula:

$$y^{\frac{1}{2}} = (\rho(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha))^{\frac{1}{2}} = \rho^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} \right)$$

che assume un unico valore per ognuno degli infiniti intervalli $[2k\pi; 2(k+1)\pi[$, con $k \in Z$, in cui può variare l'argomento della base.

Come visto nel sottoparagrafo precedente, i 2 valori della radice quadrata di y che si ottengono per $k=0,1$, con argomenti appartenenti rispettivamente agli intervalli $[0; (2\pi)/2[= [0; \pi[$ e $[(2\pi)/2; (4\pi)/2[= [\pi; 2\pi[$, sono diversi tra loro.

Al variare di k comunque in Z , i valori delle radici trovati per $k=0,1$, come detto precedentemente, si ripetono ciclicamente di 2 in 2.

1. Sia $a \in R^+$

Se supponiamo $\alpha \in [0; 2\pi[$, sarà $\alpha = 0$:

$$a^{\frac{1}{2}}_1 = a^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{0}{2} + i \operatorname{sen} \frac{0}{2} \right) = a^{\frac{1}{2}}$$

cioè la radice quadrata di a con argomento nell'intervallo $[0; \pi[$;

$$a^{\frac{1}{2}}_2 = a^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{0+2\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{0+2\pi}{2} \right) = -a^{\frac{1}{2}}$$

cioè la radice quadrata di a con argomento nell'intervallo $[\pi; 2\pi[$.

In tal caso le due radici quadrate, come è noto, sono entrambe reali¹¹.

¹¹ Nell'insieme R , le radici n -esime con n pari di numeri positivi si ottengono invertendo le funzioni $y = x^n$ che non sono invertibili nell'intero loro dominio $D =]-\infty; +\infty[$. Affinché possano essere invertibili sarà necessario restringere il loro dominio all'insieme $D_R =]-\infty; 0[$, ottenendo in tal modo la radice negativa, o all'insieme $D_R = [0; +\infty[$, ottenendo in tal modo la radice positiva.

2. Sia $a \in R^-$

Se supponiamo $\alpha \in [0; 2\pi[$, sarà $\alpha = \pi$:

$$a^{\frac{1}{2}}_1 = |a|^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right) = |a|^{\frac{1}{2}} \cdot i$$

cioè la radice quadrata di a con argomento nell'intervallo $[0; \pi[$;

$$a^{\frac{1}{2}}_2 = |a|^{\frac{1}{2}} \left(\cos \frac{\pi + 2\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi + 2\pi}{2} \right) = -|a|^{\frac{1}{2}} \cdot i$$

cioè la radice quadrata di a con argomento nell'intervallo $[\pi; 2\pi[$.

In tal caso le due radici quadrate, come è noto, non sono reali ma entrambe immaginarie.

2.5.2. Radici cubiche

I valori della radice cubica di un generico numero complesso $y = \rho(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$ si otterranno data dalla formula:

$$y^{\frac{1}{3}} = (\rho(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha))^{\frac{1}{3}} = \rho^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{\alpha}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\alpha}{3} \right)$$

che assume un unico valore per ognuno degli infiniti intervalli $[2k\pi; 2(k+1)\pi[$, con $k \in Z$, in cui può variare l'argomento della base.

Come visto nel sottoparagrafo precedente, i tre valori della radice cubica di y che si ottengono per $k=0, 1, 2$, con argomenti appartenenti rispettivamente agli intervalli $[0; (2\pi)/3[$, $[(2\pi)/3; (4\pi)/3[$ e $[(4\pi)/3; 2\pi[$, sono diversi tra loro.

Al variare di k comunque in Z , i valori delle radici trovati per $k=0, 1, 2$, come detto precedentemente, si ripetono ciclicamente di 3 in 3.

1. Sia $a \in R^+$

Se supponiamo $\alpha \in [0; 2\pi[$, sarà $\alpha = 0$:

$$a^{\frac{1}{3}}_1 = a^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{0}{3} + i \operatorname{sen} \frac{0}{3} \right) = a^{\frac{1}{3}}$$

cioè la radice cubica di a con argomento nell'intervallo $[0; (2\pi)/3[$;

$$a^{\frac{1}{3}}_2 = a^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{0+2\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{0+2\pi}{3} \right) = a^{\frac{1}{3}} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

cioè la radice cubica di a con argomento nell'intervallo $[(2\pi)/3; (4\pi)/3[$;

$$a^{\frac{1}{3}}_3 = a^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{2\pi+2\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi+2\pi}{3} \right) = a^{\frac{1}{3}} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

cioè la radice cubica di a con argomento nell'intervallo $[(4\pi)/3; 2\pi[$.

In tal caso solo la radice $a^{1/3}_1$ è reale.

2. Sia $a \in \mathbb{R}^-$

Se supponiamo $\alpha \in [0; 2\pi[$, sarà $\alpha = \pi$:

$$a^{\frac{1}{3}}_1 = |a|^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) = |a|^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

cioè la radice cubica di a con argomento nell'intervallo $[0; (2\pi)/3[$;

$$a^{\frac{1}{3}}_2 = |a|^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{\pi+2\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi+2\pi}{3} \right) = -|a|^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}}$$

cioè la radice cubica di a con argomento nell'intervallo $[(2\pi)/3; (4\pi)/3[$;

$$a^{\frac{1}{3}}_3 = |a|^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{3\pi+2\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi+2\pi}{3} \right) = |a|^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

cioè la radice cubica di a con argomento nell'intervallo $[(4\pi)/3; 2\pi[$.

In tal caso solo la radice $a^{1/3}_2$ è reale.

Analogamente si ottengono, sempre partendo dalla (2), le radici n -esime di numeri reali (positivi o negativi), qualunque sia l'indice n della radice (ovviamente, se $a=0$, $\sqrt[n]{a} = 0$).

AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI

AREA 01 – Scienze matematiche e informatiche

AREA 02 – Scienze fisiche

AREA 03 – Scienze chimiche

AREA 04 – Scienze della terra

AREA 05 – Scienze biologiche

AREA 06 – Scienze mediche

AREA 07 – Scienze agrarie e veterinarie

AREA 08 – Ingegneria civile e architettura

AREA 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione

AREA 10 – Scienze dell'antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche

AREA 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

AREA 12 – Scienze giuridiche

AREA 13 – Scienze economiche e statistiche

AREA 14 – Scienze politiche e sociali

AREA 15 – Scienze teologico–religiose

Il catalogo delle pubblicazioni di Aracne editrice è su

www.aracneeditrice.it

Finito di stampare nel mese di novembre del 2018
dalla tipografia «The Factory S.r.l.»
00156 Roma – via Tiburtina, 912
per conto della «Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale» di Canterano (RM)